



Λέμφωμα ουροδόχου κύστεως σε ασθενή με αιματουρία – Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού

Μπαλαξής Π.¹, Τσιμοπούλου Β.¹, Κλαμπάτσας Α.¹, Καραβασίλης Β.¹, Παπαδάκης Δ.¹, Μήτσιος Σ.¹ Γκατζός Στ.¹ Μουστάκας Γ.¹

Ουρολογική-Ογκολογική Κλινική, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΣΚΟΠΟΣ: Το λέμφωμα της ουροδόχου κύστης (LUB) αποτελεί εξαιρετικά σπάνια νεοπλασματική οντότητα, συχνότερη στις γυναίκες, με <100 καταγεγραμμένες περιπτώσεις.

Το διάχυτο λέμφωμα μεγάλων Β-κυττάρων (DLBCL): δεύτερος συχνότερος ιστολογικός τύπος LUB.

Σκοπός της εργασίας, η παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού DLBCL της ουροδόχου κύστης, που ανιχνεύθηκε μετά TUR-BT.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Γυναίκα 77 ετών με συμπτωματολογία ήπιας αιματουρίας και οσφυαλγία. Από MRI ΟΜΣΣ: ογκόμορφες βλάβες ΟΜΣΣ, από CT ΘΑΚΚΟ οζιδιακοί σχηματισμοί στο θώρακα, βλάβη στο ήπαρ, πολυεστιακή λεμφαδενοπάθεια. Υπερηχογράφημα ΝΟΚ: συμπαγές μórφωμα 4,5 cm στο δεξιό πλάγιο τοίχωμα της κύστης.


Η ασθενής υπεβλήθη σε διουρηθρική εκτομή συμπαγούς όγκου δεξιού πλαγίου τοιχώματος και ακολούθησε ανεπίπλεκτη πορεία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από ιστολογική εξέταση αναδείχθηκε υψηλού βαθμού κακοήθειας DLBCL (πιθανώς λεμφοθυλακιώδες) Grade 3B.

PET – FDG σταδιοποίησης: οζίδιο μέσου λοβού ΔΕ πνεύμονα, παθολογικοί λεμφαδένες υποκλείδιοι, πυλαίος και οπισθοπεριτοναικοί και πάχυνση δεξιού και πλαγίου τοιχώματος ουροδόχου κύστεως.

Παραπέμφθηκε στην Αιματολογική Κλινική για περαιτέρω αντιμετώπιση. Διενεργήθηκε οστεομυελική βιοψία. Με ανοσοϊστοχημικές χρώσεις CD20, CD3, CD79a επιβεβαιώθηκε σε μικρό ποσοστό διήθηση από οζώδες λέμφωμα. Τέθηκε σε θεραπεία με Rituximab – CHOP, την οποία ανέχθηκε καλώς. Ολοκλήρωσε δυο κύκλους θεραπείας και προγραμματίστηκε με το πέρας του 3^{ου} κύκλου εκ νέου PET – CT και κυστεοσκόπηση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το LUB παρότι σπάνιο, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση των ασθενών στους οποίους ανευρίσκεται όγκος ουροδόχου κύστης. Η λήψη βιοψιών από τον όγκο αποτελεί τον μόνο τρόπο επιβεβαίωσης της νόσου. Η έγκαιρη διάγνωση και έναρξη θεραπείας είναι καθοριστικής σημασίας για την έκβαση.



1. Downs TM, Kibel AS, DeWolf WC. Primary lymphoma of the bladder: a unique cystoscopic appearance. Urology. 1997;49(2):276–278. doi: 10.1016/S0090-4295(96)00449-9.
2. JACOBS A, SYMINGTON T. Primary lymphosarcoma of urinary bladder. British journal of urology. 1953;25(2):119–126. doi: 10.1111/j.1464-410x.1953.tb09253.x.
3. Yusim IE, Neulander EZ, Eidelberg I, Lismer LJ, Kaneti J. Leiomyoma of the genitourinary tract. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology. 2001;35(4):295–299. doi: 10.1080/003655901750425873.