

## PP85

Σπάνια περίπτωση πρωτοπαθούς λεμφώματος Hodgkin δεξιού νεφρού: Παρουσίαση περιστατικού

Αναστάσιος Δήμου Ειδικ. Ουρολογίας, Μπέλτσιου Μαρία Ειδικ. Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, Παράσχου Αριστοκλής Ειδικ. Ουρολογίας, Ναούμ Σπυρίδων Ειδικ. Ουρολογίας, Αναγνώστου Γεώργιος Ειδικ. Αιματολογίας, Μπελαντής Χαράλαμπος Β΄ Επιμ. Ουρολογίας, Τζωρτζακάκης Δημήτριος Α΄ Επιμ. Ουρολογίας, Τζουλάκης Σταύρος Δ/ντης Ουρολογίας, Καλπαδάκη Χριστίνα Αναπλ. Καθηγ. Αιματολογίας, Χαιρέτης Ιωάννης Δ/ντης Ουρολογικής Κλινικής Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΑΝΕΙΟ



### Σκοπός

Η παρουσίαση μιας εξαιρετικά σπάνιας περίπτωσης πρωτοπαθούς λεμφώματος Hodgkin εντοπιζόμενου αποκλειστικά στον δεξιό νεφρό με σκοπό να αναδειχθεί η διαγνωστική πρόκληση από άλλες νεφρικές μάζες, καθώς και τη σημασία της ιστολογικής επιβεβαίωσης για την ορθή θεραπευτική προσέγγιση.

### Υλικό/Μέθοδος

Άνδρας 60 ετών με γνωστό ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη τύπου II και δυσλιπιδαιμία, προσήλθε λόγω μάζας δεξιού νεφρού που ανευρέθηκε σε προληπτικό υπερηχογράφημα. Ο εργαστηριακός έλεγχος δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα. Η απεικονιστική διερεύνηση με αξονική τομογραφία ανέδειξε μάζα 8,5 x 5,5 x 6 εκ. στον άνω πόλο του δεξιού νεφρού, ύποπτη για νεοπλασία. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε δεξιά ριζική νεφρεκτομή.

### Αποτελέσματα

Η ιστολογική ανάλυση της νεφρικής βλάβης κατέδειξε πρωτοπαθές κλασσικό λέμφωμα Hodgkin τύπου οζώδους σκλήρυνσης, χωρίς διήθηση των λεμφαδένων ή άλλων ιστών. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή, χωρίς επιπλοκές. Η περαιτέρω σταδιοποίηση με PET-CT δεν ανέδειξε ενδείξεις συστηματικής νόσου ή άλλης εντόπισης. Ο ασθενής παραπέμφθηκε στην αιματολογική κλινική όπου έλαβε 2 κύκλους ABVD. Εντός 2 ετών παρακολούθησης, δεν έχει καταγραφεί υποτροπή.

### Συμπεράσματα

Το πρωτοπαθές νεφρικό λέμφωμα τύπου Hodgkin που εμφανίζεται σε πυελικούς λεμφαδένες ή στο νεφρικό παρέγχυμα εμφανίζεται σε < 1 % των πρωτοπαθών νεφρικών λεμφωμάτων [1]. Ως αποτέλεσμα της σπανιότητας αυτής της κακοήθειας, υπάρχουν πολύ περιορισμένα δεδομένα για τη συχνότητά της, τη βέλτιστη διαχείριση και την κλινική έκβαση, κυρίως από αναφορές περιστατικών ή σειρές περιστατικών [2]. Η χημειοθεραπεία είναι η προτιμώμενη θεραπεία, αλλά ο συνδυασμός της με ακτινοθεραπεία, χειρουργική επέμβαση ή άλλες θεραπείες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για νεότερους ασθενείς [3].

#### Βιβλιογραφία:

1. Bokhari MR, Rana UI, Bokhari SRA. Renal Lymphoma [Internet]. PubMed. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526034/>
2. Asad Hayat Ahmad, MacLennan GT, Listinsky CM. PRIMARY RENAL LYMPHOMA: A RARE NEOPLASM THAT MAY PRESENT AS A PRIMARY RENAL MASS. The Journal of Urology. 2005 Jan 1;173(1):239–9.
3. Xiao Dong Chen, Hu DF, Fang L, Chen YC, Che X, Sun Q, et al. Primary renal lymphoma: A case report and literature review. 2016 Nov 1;12(5):4001–8.