

Αμφοτερόπλευροι κεφαλικοί δισχιδείς ουρητήρες με ορθότοπες ουρητηροκήλες με λιθίαση: Ενδοουρολογική αντιμετώπιση

Συγγραφείς: Τιμολέων Γιάννακας, Δημήτριος Δεληγιάννης, Ηλίας Γιαννακόδημος, Ανδρέας Κουμενής, Νικόλαος Ράζος, Μάριος Σταυρόπουλος, Ζήσης Κρατήρας, Άρης Καλτσάς, Μιχαήλ Χρυσοφός

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Γυναίκα ασθενής, 60 ετών, με ιστορικό σταδιακά επιδεινούμενων δυσουρικών ενοχλημάτων από διαιτίας και επεισόδιο κολικού αριστερού νεφρού προ εβδομάδας. Σε αξονική ουρογραφία διαπιστώθηκε αμφοτερόπλευρο διπλό πυελοκαλυκικό σύστημα με δισχιδείς κεφαλικούς ουρητήρες τύπου Υ (ατελής διπλασιασμός ουρητήρων άμφω), ορθότοπες ουρητηροκήλες αμφοτερόπλευρα, λίθος 8 mm στην πύελο του κάτω ΠΚΣ αριστερά, λίθο 2.8 cm εντός της ευμεγέθους ουρητηροκήλης δεξιά και πολλαπλούς λίθους έως 7 mm στην αριστερή ουρητηροκήλη.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ασθενής υποβλήθηκε σε διουρηθρικήσχάση της αριστερής ουρητηροκήλης, απελευθέρωση των λίθων που υπήρχαν εντός αυτής και αφαίρεση των λίθων. Υπεβλήθη επίσης σεσχάση της ευμεγέθους δεξιάς ουρητηροκήλης, laser κυστεολιθοτριψία του λίθου που υπήρχε εντός αυτής και turis εκτομή της περίσσειας του ιστού. Τέλος, τοποθετήθηκε rigtail αριστερά. Σε δεύτερο χρόνο πραγματοποιήθηκε RIRS λιθοτριψία του λίθου του αριστερού κάτω πυελοκαλυκικού συστήματος.

Η ασθενής παρουσίασε πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων και φυσιολογική κυστεοσκοπική εικόνα των ουρητηρικών στομιών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Η συνύπαρξη αμφοτερόπλευρων ορθότοπων ουρητηροκηλών σε αμφοτερόπλευρο ατελές διπλό πυελοκαλυκικό σύστημα είναι ιδιαίτερα σπάνια, με την ταυτόχρονη παρουσία πολλαπλής λιθίασης να την καθιστά ακόμα πιο ιδιαίτερη. Η ελάχιστα επεμβατική, διουρηθρική διαχείριση αποδείχθηκε αποτελεσματική και ασφαλής, αποφεύγοντας την ανάγκη μείζονος χειρουργείου.



Εικόνα 1: Διπλό πυελοκαλυκικό σύστημα άμφω και λιθίαση αριστερά



Εικόνα 2: Ευμεγέθης λίθος εντός δεξιάς ουρητηροκήλης, πολλαπλοί λίθοι εντός αριστερής ουρητηροκήλης



Εικόνα 3: Ευμεγέθης λίθος εντός ορθότοπης ουρητηροκήλης