

Πρωτιαίο έπαρμα και συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού

Γκούνη Παπαϊωάννου Βικτωρία Μυρτώ, Κυριόπουλος Χρήστος, Παπακωνσταντίνου Άννα, Στεφανίδης Αντώνιος, Μήτσος Παναγιώτης
Ουρολογική Κλινική Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εργασίας μας είναι να αναδειχθεί η πιθανότητα συνύπαρξης ανωμαλίας του ουροποιητικού συστήματος με κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, όπως το πρωτιαίο έπαρμα.

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ

Ο μικρός ασθενής ηλικίας 14 μηνών παρουσίαζε πρωτιαίο έπαρμα και, κατόπιν σύστασης του παιδίατρου, υπεβλήθη σε υπερηχογράφημα ΝΟΚ λόγω πιθανής συνύπαρξης ανωμαλίας του ουροποιητικού συστήματος. Στην εξέταση αυτή αρχικά διαπιστώθηκε κύστη νεφρού δεξιά (διαμέτρου 1 εκ). Η περιοδική υπερηχογραφική παρακολούθηση ανέδειξε την αύξηση των διαστάσεων (4.6εκ x 4εκ x 3.8εκ) ενώ ο απεικονιστικός έλεγχος ολοκληρώθηκε με μαγνητική τομογραφία, όπου διαπιστώθηκε απουσία διαφραγμάτων και συμπαγών στοιχείων εντός του κυστικού μορφώματος, καθώς και απουσία επικοινωνίας αυτού με το αποχετευτικό σύστημα. Το σπινθηρογράφημα νεφρών ανέδειξε ψυχρή εικόνα στο έξω χείλος της μεσότητας του δεξιού νεφρού.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Λόγω αύξησης του μεγέθους της κύστης και ήπιας μείωσης λειτουργίας του νεφρού, πραγματοποιήθηκε εκτομή της κύστης του δεξιού νεφρού και ο ασθενής είχε καλή μετεγχειρητική πορεία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το πρωτιαίο έπαρμα σε ποσοστό 92% δεν συνυπάρχει με άλλη συγγενή ανατομική ανωμαλία του ουροποιητικού. Ωστόσο, το παρόν περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία του ως εν δυνάμει φαινοτυπικού δείκτη υποκείμενης νεφρικής δυσπλασίας και υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρη διερεύνηση με απεικόνιση του ουροποιητικού συστήματος, γενετικό έλεγχο, όπου χρειάζεται, καθώς και συνεχή παρακολούθηση.