

Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού με διπλή ουρήθρα

Γκούνη Παπαϊωάννου Βικτωρία Μυρτώ, Κυριόπουλος Χρήστος, Κατελανή Σταματία, Παπακωνσταντίνου Άννα, Στεφανίδης Αντώνιος, Μήτσος Παναγιώτης
Ουρολογική Κλινική Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΣΚΟΠΟΣ

Η επίπτωση της πάθησης δεν είναι καλά καθορισμένη, λόγω της σπανιότητάς της, αλλά εκτιμάται ότι εμφανίζεται σε περίπου 1/5.000-6.000 γεννήσεις αγοριών. Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρουσίαση της αντιμετώπισης της σπάνιας αυτής συγγενούς ανωμαλίας.

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ

Ασθενής ηλικίας 9.5 ετών, με ιστορικό χειρουργηθείσας ατρησίας ορθού, τραχειο-οισοφαγικού συριγγίου και επεισοδίου κυστίτιδας προ τριετίας, προσήλθε για παιδοουρολογική εκτίμηση λόγω σταγονοειδούς εκροής ούρων από τη κοιλιακή επιφάνεια του πέους. Ο γενόμενος απεικονιστικός έλεγχος με κυστεοουρηθρογραφία και υπερηχογράφημα δεν ανέδειξε παθολογία.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ουρηθροκυστεοσκόπηση κατά την οποία ανευρέθη διπλή ουρήθρα τύπου «Υ» και ακολούθησε εκτομή του αυλού της επικουρικής ουρήθρας σε μήκος περίπου 1.5εκ. Ο μικρός ασθενής είχε ομαλή μετεγχειρητική πορεία και ο ουροκαθετήρας αφαιρέθηκε την 5^η μετεγχειρητική ημέρα προ εξόδου.

Κατά την επανεξέταση, 1 χρόνο μετά, ο ασθενής είναι ελεύθερος συμπτωματολογίας και με καλό χειρουργικό αποτέλεσμα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εκροή ούρων από την πεϊκή ουρήθρα με ταυτόχρονη φυσιολογική ακτίνα ούρησης θα πρέπει να θέτει την υποψία της συγγενής ανατομικής ανωμαλίας της διπλής ουρήθρας. Η διάγνωση γίνεται κυστεοσκοπικά, ενώ η θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική εκτομή της επικουρικής ουρήθρας.



Με το κόκκινο βέλος απεικονίζεται ο αυλός της επικουρικής ουρήθρας