



Σπάνια περίπτωση μετάστασης διαυγοκυτταρικού καρκίνου νεφρού στον θυρεοειδή αδένα

Μπαλαξής Π.¹, Τσιμοπούλου Β.¹, Κλαμπάτσας Α.¹, Καραβασίλης Β.¹, Παπαδάκης Δ.¹, Μήτσιος Σ.¹ Γκατζός Στ.¹ Μουστάκας Γ.¹


Ουρολογική-Ογκολογική Κλινική, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΣΚΟΠΟΣ: Ο πιο συχνός ιστολογικός τύπος νεφροκυτταρικού καρκίνου είναι το διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα. 33% των ασθενών εμφανίζουν μεταστάσεις, συνήθως στους πνεύμονες και τα οστά και πιο σπάνια σε εγκέφαλο, ήπαρ, επινεφρίδια, όρχεις, ωθήκες. Ο μέσος χρόνος επιβίωσης ασθενών με μεταστατικό καρκίνο νεφρού είναι 6 - 12 μήνες, ενώ η διετής επιβίωση 10-20%.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Άνδρας ασθενής 56 ετών, με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα διαυγοκυτταρικού τύπου, (pT1_b, N₀, M₀), διαγνωσθέν το 2008 μετά από δεξιά νεφρεκτομή. Το ίδιο έτος ανευρέθη αμάρτωμα δεξιού πνεύμονα και ευμεγέθους όζος αριστερού λοβού θυρεοειδούς. Το 2023 υπεβλήθη σε δεξιά ημικολεκτομή (λαχνωτό αδένωμα υψηλόβαθμης δυσπλασίας στο ανιόν κόλον), ακολούθησαν χημειοθεραπείες έως τον Ιανουάριο 2024. Κατά τον επανέλεγχο απεικονιστικά διαπιστώθηκε αύξηση του μέγεθος του θυρεοειδικού όζου, που καταδυόταν στο ανώτερο μεσοθωράκιο με παρεκτόπηση της τραχείας, χωρίς ωστόσο να τεκμηριώνεται κακοήθεια (Bethesda I – II) από τις βιοψίες FNA.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τον Ιανουάριο 2025 υπεβλήθη σε ολική θυρεοειδεκτομή. Ομαλή μετεγχειρητική πορεία. Η βιοψία ανέδειξε αλλοιώσεις οζώδους κολλοειδούς βρογχοκήλης με παρουσία υπερπλαστικού όζου με εικόνα οξύφιλου αδενώματος ή καρκινώματος. Μετά από επανεκτίμηση του βιοπτικού υλικού, το εύρημα χαρακτηρίστηκε συμβατό με μετάσταση στο θυρεοειδή από διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα του νεφρού. Οι πρόσφατες απεικονιστικές εξετάσεις του ασθενούς δεν ανέδειξαν παθολογικά ευρήματα. Κατόπιν απόφασης Ογκολογικού Συμβουλίου βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η περίπτωση, ιδιαίτερα σπάνια, αναδεικνύει την ανάγκη μακροχρόνιας παρακολούθησης ασθενών με νεοπλασίες και την ιδιαίτερη προσοχή που απαιτεί η διερεύνηση νέων βλαβών σε ασθενείς με ιστορικό καρκίνου. Η εμφάνιση μεταστατικής εστίας είναι πιθανή ακόμα και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.



1. Rizzo M, Rossi RT, Bonaffini O, et al. Thyroid metastasis of clear cell renal carcinoma: Report of a case. Diagn Cytopathol. 2009;37(10):759–62. doi: 10.1002/dc.21117.
2. Chung AY, Tran TB, Brumund KT, et al. Metastases to the thyroid: a review of the literature from the last decade. Thyroid. 2012;22(3):258–68. doi: 10.1089/thy.2010.0154.
3. Kobayashi K, Hirokawa M, Yabuta T, et al. Metastatic carcinoma to the thyroid gland from renal cell carcinoma: Role of ultrasonography in preoperative diagnosis. Thyroid Res. 2015;8:4. doi: 10.1186/s13044-015-0016-4.