



Rezum σε ασθενείς με επίσχεση ούρων και αδυναμία απεξάρτησης από τον καθετήρα

Ερμίδης Δ.¹, Καταφυγιώτης Ι.¹, Λεωτσάκος Ι.¹, Νικητάκης Φ.², Ζαμπαύτης Χ.¹, Σιδερωμένος Π.¹, Γρίβας Ν.¹, Καραβιτάκης Μ.¹

¹Κέντρο Central Urology, Κλινική Λευκός Σταυρός the Athens Clinic, ²Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας

Κέντρο Προηγμένης Λαπαροσκοπικής
και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής
Ουρολογίας
Κλινική Λευκός Σταυρός,
the Athens Clinic



25^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ



6-9 Οκτωβρίου 2022
Grand Hyatt Conference Center, Αθήνα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email: centralurology2021@gmail.com
Phone: 00306934656001
Website: www.centralurology.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ

- ✓ Η επίσχεση ούρων και η αδυναμία απεξάρτησης από τον καθετήρα αποτελεί μια σημαντική επιπλοκή της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη που επηρεάζει σημαντικά την QoL.
- ✓ Τα τελευταία χρόνια στις επιλογές του ενδοουρολόγου έχει προστεθεί και η τεχνική Rezum.
- ✓ Αν και δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες, θεωρείται τεχνική που εφαρμόζεται σε μεγέθη προστάτη 30-60 κυβικά εκατοστά, χωρίς να έχει μελετηθεί η αποτελεσματικότητα της στην αποδέσμευση από τον καθετήρα

ΣΚΟΠΟΣ :

Η αποτελεσματικότητα της τεχνικής της ενέργειας των υδρατμών στην αποδέσμευση ασθενών με επίσχεση ούρων από τον καθετήρα, σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά ή εμφανίζουν συνοσηρότητα και δεν μπορούν να λάβουν γενική αναισθησία.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Πληθυσμός Μελέτης	
N	5
Ηλικία	64,4 (έτη)
Χρόνος καθετηριασμού	62 (μέρες)
Όγκος Προστάτη	63,4 κεκ
Προσπάθειες αποδέσμευσης	2,6(2-4)
Αντιπηκτικά	5

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αποτελέσματα	
Χρόνος Επέμβασης	12.28 (min)
Πλήθος θεραπειών	4,8(4-6)
Καθετηριασμός	15 μέρες
Εξιτήριο	11,6 ώρες
Πυρετός	0
Αιμορραγία	0
Αποδέσμευση από καθετήρα	5(100%)



ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Turis : Gold Standard επιλογή με αποτελεσματικότητα αποδέσμευσης από τον καθετήρα 85-90%
- Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους ασθενείς ειδικά με υψηλό ASA ή αδυναμία διακοπής αντιπηκτικών
- Οι ασθενείς με ενδοφλέβια καταστολή και χωρίς διακοπή αντιπηκτικών υποβλήθηκαν χωρίς επιπλοκές σε λιγότερα από 13 λεπτά στην επέμβαση
- Όλοι οι ασθενείς αποδεσμεύτηκαν από τον καθετήρα χωρίς μάλιστα την εμφάνιση επιπλοκών
- Το Rezum ίσως μελλοντικά να αποτελεί μια ακόμα εναλλακτική στην αντιμετώπιση του μόνιμου καθετηριασμού
- Αυτή αποτελεί την πρώτη πανελλαδικά μελέτη που εξετάζει το Rezum ως επιλογή αντιμετώπισης του μόνιμου καθετηριασμού

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- 1) Eredics K, Wehrberger C, Henning A, Sevcenco S, Marszalek M, Rauchenwald M, Falkensammer C, Stoces U, Madersbacher S, Horetzky M, Kunit T, Lusuardi L. Rezūm water vapor therapy in multimorbid patients with urinary retention and catheter dependency. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2022 Feb;25(2):302-305.
- 2) Gravas S, Cornu JN, Gacci M, Gratzke C, Herrmann TRW, Mamoulakis C, et al. EAU guidelines on management of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms (LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO). Eur Assoc Urol. 2021.
- 3) Brierly RD, Mostafid AH, Kontothanassis D, Thomas PJ, Fletcher MS, Harrison NW. Is transurethral resection of the prostate safe and effective in the over 80-year-old? Ann R Coll Surg Engl. 2001 Jan;83(1):50-3.