

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΗΣΗ(FURS) ΥΠΟ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ. Α. Φιλντίσης, Π. Χιώτης, Ε. Σεραφετινίδης, Ε. Ηλιάκης, Ε. Γεωργάκης, Δ. Δελακάς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΣΚΟΠΟΣ


- Πλειοψηφία των fURS γίνονται υπό γενική αναισθησία.
- Ραχιαία(PA): λιγότερος κίνδυνος και μικρή μετεγχειρητική νοσηρότητα
- Σκοπός μελέτης η ανάδειξη των τεχνικών λεπτομερειών, αποτελεσμάτων, επιπλοκών και η ικανοποίηση των ασθενών μετά από fURS υπό PA

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Εξιτήριο επόμενο πρωί, εκτός από 6 που παρουσίασαν εμπύρετο και παρέμειναν 1-7 ημέρες επιπλέον.
- Μέσος χειρουργικός χρόνος 45 min +/- 20 min.
- Ποσοστό ελεύθερου λιθίασης μετά την fURS ήταν 75,2%
- Νέα fURS/ESWL στο 24,8% των ασθενών.
- Το 98% των ασθενών όχι επιπλοκές σχετιζόμενες της αναισθησίας.
- Επίπεδο ικανοποίησης ξεπέρασε το 97% των ασθενών και δήλωσαν την προτίμησή τους για ίδια τεχνική σε μελλοντική επέμβαση.

ΜΕΘΟΔΟΣ

- 47 fURS υπό PA για νεφρολιθίαση από 09/2019 έως 05/2022
- Όλοι οι ασθενείς: έφεραν προεγχειρητικά αυτοσυγκρατούμο ουρητηρικό καθετήρα, δεν είχαν υποβληθεί σε ανάλογη επέμβαση και είχαν μονήρη λίθο < 2 cm.
- Μέση ηλικία ασθενών 58 έτη(39-72). Από αυτούς 25 άνδρες και 22 γυναίκες
- Η PA έγινε στο L2-L3 μεσοσπονδύλιο διάστημα σε ποσοστό 97%



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- FURS υπό PA: ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος
- Υψηλή ικανοποίηση ασθενών, σπάνιες οι επιπλοκές
- Διευκόλυνση επέμβασης με την προηγούμενη τοποθέτηση αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού stent (pig tail)
- Αυξημένα επίπεδα άγχους λόγω περιβάλλοντος της

