

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΥ STENT ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΗΣΗ (fURS)?

Α. Φιλντίσης, Ε. Ηλιάκης, Ε. Σεραφετινίδης, Σ. Τοπαλίδης, Χ. Κωνσταντινίδης, Δ. Δελακάς -
Ουρολογική κλινική - Γ.Ν. Ασκληπίειο Βούλας

ΣΚΟΠΟΣ

Η αναδρομική εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και της ασφάλειας της fURS χωρίς την προεγχειρητική τοποθέτηση ουρητηρικού stent.




ΜΕΘΟΔΟΣ

Έγινε ανασκόπηση την τελευταία 2ετία σε 118 ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε fURS .Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ομάδες:

1. 65 χωρίς τοποθέτηση ουρητηρικού stent προεγχειρητικά
2. 53 με τοποθέτηση stent.

Αξιολογήθηκε συγκριτικά ανάμεσα στις 2 ομάδες :

- α) ο χειρουργικός χρόνος ,
- β) ο χρόνος νοσηλείας ,
- γ) τα ποσοστά ελεύθερου λιθίασης ,
- δ) οι επιπλοκές ,
- ε) τα ποσοστά επανεπέμβασης.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο μέσος χειρουργικός χρόνος στην ομάδα 1 ήταν μικρότερος σε σχέση με την ομάδα 2 (55 +/- 10 min έναντι 60 +/- 15 min), ο χρόνος νοσηλείας είναι στατιστικά μη σημαντικός για τις 2 ομάδες (24 – 36 ώρες) ,παρόμοια ποσοστά όσον αφορά τις επιπλοκές και τα ποσοστά ελεύθερου λιθίασης , μια αύξηση στα ποσοστά επανεπέμβασης στην ομάδα των μη καθετηριασμένων (7 στους 65 έναντι 2 στους 53)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι fURS χωρίς την προεγχειρητική τοποθέτηση ουρητηρικού stent αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο για την αντιμετώπιση της λιθίασης του ανώτερου ουροποιητικού.

