

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ

Ι. Ελευθερόπουλος, Σ. Τοπαλίδης, Α. Φιλντίσης, Ε. Ηλιάκης, Π. Χιώτης, Δ. Δελακάς
Ουρολογική κλινική - Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας

Εισαγωγή



- Η αξονική Τομογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
- Για την αναγνώριση των νεφρικών λίθων
- Για την αξιολόγηση του αποτελέσματος της εξωσωματικής λιθοτριψίας και την αναγνώριση πιθανών επιπλοκών απ' αυτήν
- Και την παροχή πληροφοριών για την μετέπειτα θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς

Υλικά & μέθοδοι

- 360 ασθενείς (190 άντρες και 170 γυναίκες) υποβλήθηκαν σε εξωσωματική λιθοτριψία και CT έλεγχο
- 2017 - 2022
- Αφορούσε λιθίαση νεφρού από 0,7cm-1,6cm βάση της αξονικής τομογραφίας
- 120 ασθενείς παρουσίαζαν ακτινοδιαπερατή λιθίαση
- Έγινε έλεγχος του αποτελέσματος με νέα αξονική τομογραφία
- Αλλά και πιθανών επιπλοκών από την εξωσωματική λιθοτριψία
- Ο έλεγχος της λιθίασης με αξονική τομογραφία είναι σημαντικός:
- Στη διάγνωση και στο follow-up των ασθενών
- Στο να αναγνωριστούν εγκαίρως επιπλοκές που μπορεί να παρουσιαστούν
- Στις περιπτώσεις ακτινοδιαπερατής λιθίασης η αξονική τομογραφία φαίνεται να είναι η ιδεώδης εξέταση τόσο για τη διάγνωση, όσο και για τη μετέπειτα παρακολούθησής της πορείας μετά την ESWL

Αποτελέσματα

- Μέση ηλικία των ασθενών: 46έτη (38-76)
- 200 ασθενείς: αριστερός νεφρός
- Από το σύνολο των ασθενών μετά την ESWL στους 250 ελέγχθηκε θριμματισμός του λίθου
- Στους 70 παρέμενε λιθιασικό φορτίο
- Στους 10 ανευρέθει ασαφопоίηση του περινεφρικού λίπους
- Σε 9 ανευρέθει αιμάτωμα <2cm
- Ενώ σε 3 ασθενείς αναγνωρίστηκε μεγάλο αιμάτωμα >2cm
- Τέλος βάση του επανελέγχου με την αξονική τομογραφία 54 ασθενείς προτάθηκε επανάληψη, οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν σε ημιάκαμπτοι ή εύκαμπτη



25^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

6-9 Οκτωβρίου 2022
Grand Hyatt Conference Center, Αθήνα

