ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΒΟΥΒΩΝΙΚΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΕΟΥΣ.

Κ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ[1], Κ. ΤΣΙΡΚΑΣ[2], Π. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ[1], Ε. ΣΑΡΡΗ[2], Σ.ΤΥΡΙΤΖΗΣ[2]


Γ' ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΗΤΕΡΑ»
Δ' ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»

Εισαγωγή


Η βουβωνική λεμφαδενεκτομή στον καρκίνο του πέους είναι μια επέμβαση με σημαντικό ποσοστό μείζονων επιπλοκών. Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει μεγάλο ενδιαφέρον η ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση, χάρη στα εξαιρετικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα. Περιγράφουμε την τεχνική μας στη **ρομποτική τροποποιημένη βουβωνική λεμφαδενεκτομή** και αναλύουμε τα αποτελέσματά μας στους πρώτους ασθενείς μας.

Μέθοδοι

Διενεργήθηκαν 7 ρομποτικές βουβωνικές λεμφαδενεκτομές σε 5 ασθενείς (2 αμφοτερόπλευρες, ταυτόχρονα με πυελικό λεμφαδενικό καθαρισμό και 3 ετερόπλευρες).











Αποτελέσματα

Ο μέσος χειρουργικός χρόνος ανά πλευρά λεμφαδενεκτομής ήταν 70 λεπτά. Μέσος αριθμός λεμφαδένων ανά πλευρά ήταν 8. Μέσος αριθμός θετικών λεμφαδένων ήταν 1.8. Μετεγχειρητικά, καταγράψαμε ως επιπλοκές, 1 κυτταρίτιδα που αντιμετωπίστηκε συντηρητικά και μέσο χρόνο λεμφόρροιας τις 13.6 ημέρες (10-25 ημέρες). Μέσος χρόνος παρακολούθησης είναι 32.8 μήνες. **Όλοι οι ασθενείς είναι ελεύθεροι νόσου έως σήμερα.**

Συμπεράσματα

Η ρομποτική βουβωνική λεμφαδενεκτομή αποτελεί μια εξαιρετική χειρουργική επιλογή έναντι της ανοικτής επέμβασης, επιδεικνύοντας εφάμιλλο ογκολογικό αποτέλεσμα, με σημαντικά μικρότερο ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών.