ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΟΡΧΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ –A case report

Σωτήριος Σταύρου[1], Αθανάσιος Παλιούρας[4], Δημήτριος Βλάχος[2], Βασίλειος Γκόγκος[3], Μαίρη Μουσελίμη [3],Αθηνά Τσίλη[5], Κωνσταντίνος Οικονόμου[1]

1.Ουρολογική Κλινική , ΓΝ Φιλιατών , 2. Αναισθησιολογικό Τμήμα , ΓΝ Φιλιατών ,3.Ακτινολογικό Τμήμα ,ΓΝ Φιλιατών ,

4.Ουρολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων,5.Ακτινολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ

Οι αδενωματοειδείς όγκοι (ΑΤ) είναι καλοήθεις εξεργασίες μεσοθηλιακής προέλευσης και αποτελούν το 30% των παραορχικών όγκων. Εξορμούνται συνήθως από την επιδιδυμίδα και λιγότερο συχνά από τους χιτώνες των όρχεων , τον σπερματικό τόνο και το ορχικό παρέγχυμα, μιμούμενοι κακοήθεις εξεργασίες. Εμφανίζονται ως τυχαίο εύρημα ή ως ανώδυνες ψηλαφητές διογκώσεις του οσχέου, είναι βραδέως αναπτυσσόμενοι και σπανίως συνοδεύονται από πόνο. Απαντούν σε όλες τις ηλικίες ,συνηθέστερα όμως σε άνδρες 30 – 50 ετών. Η αρχική διερεύνηση περιλαμβάνει υπερηχογράφημα - MRI οσχέου, καρκινικούς δείκτες και CT κοιλίας για αποκλεισμό κακοήθειας και η διάγνωση επιβεβαιώνεται ιστοπαθολογικά , μετά την χειρουργική εξαίρεση της βλάβης. Παρουσιάζουμε περίπτωση άνδρα με ΑΤ προερχόμενο από τους χιτώνες των όρχεων (tunica albuginea).

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ


Άνδρας 56 ετών προσήλθε λόγω διόγκωσης δεξιού ημιοσχέου από έτους , χωρίς ιστορικό κάκωσης, λοίμωξης ή κακοήθειας και η κλινική εξέταση ανέδειξε ήπια επώδυνη ψηλαφητή σκληρία δεξιού όρχεως. Οι καρκινικοί δείκτες ήταν αρνητικοί ,η CT κοιλίας χωρίς παθολογικά ευρήματα και η απεικόνιση με US και MRI οσχέου ανέδειξε σχηματισμό 0,8 εκ σε επαφή με τον κάτω πόλο του δεξιού όρχεως, με χαμηλό σήμα στην Τ2 ακολουθία και ασθενώς εμπλουτιζόμενο(Εικ. 1-2). Τα ανωτέρω ευρήματα είναι συμβατά με αδενωματοειδή όγκο του παραορχικού χώρου. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική εκτομή της περιγραφείσας αλλοίωσης (Εικ. 3).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Το ιστοπαθολογικό πόρισμα επιβεβαίωσε την διάγνωση του εξωορχικού αδενωματοειδούς όγκου και ο ασθενής τέθηκε σε παρακολούθηση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι αδενωματοειδείς όγκοι είναι σπάνιες καλοήθεις διαταραχές που μπορεί να δημιουργήσουν δυσκολία στη διάγνωση, ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται σε ασυνήθιστες θέσεις πλησίον ή εντός του ορχικού παρεγχύματος. Ο ενδελεχής κλινικοεργαστηριακός έλεγχος οδηγεί στη διάγνωση, στην αποφυγή ριζικών επεμβάσεων και τελικά στη διατήρηση της ορχικής λειτουργίας.



ΕΙΚΟΝΑ 1


ΕΙΚΟΝΑ 2


ΕΙΚΟΝΑ 3

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Vasileios Rafailidis, Dean Y. Huang, Paul S. Sidhu. Paratesticular lesions: Aetiology and appearances on ultrasound Andrology 2021 Sep;9(5):1383-1394
2. . Pichler R, Tulchiner G, Steinkohl F, et al. Adenomatoid tumor of the testis mimicking malignant testicular cancer on multiparametric ultrasound. Eur J Med Res. 2018; 23: 3
3. Duqun Chen,et al. Adenomatoid tumors of the testis: A report of two cases and review of the literature. Oncol Lett. 2014 May; 7(5): 1718–1720.
4. Hiromi Edo ,Fumiko Yagi ,et al. Extratesticular masses focusing on MRI findings. Jpn J Radiol 2024 Jun 5