
ΑΞΙΟΛΟΓΗΓΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ VESSILEN® (ADELMIDROL 2% + HYALURONIC ACID 0,1%) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΚΥΣΤΙΤΙΔΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.

Κόλβατζης Μ., Δρόσος Κ., Γάτσος Σ., Παπανικολάου Δ., Καλινδέρης Ν., Καλαϊτζή Μ., Αποστολίδης Α.
Β΄ Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ – Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Σκοπός: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έπειτα από ενδοκυστική έγχυση Vessilen σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες μικροβιακές κυστίτιδες, σύνδρομο επώδυνης κύστης, χημική κυστίτιδα κατά την αντικαρκινική θεραπεία και μετακτινική κυστίτιδα.

Μηχανισμός δράσης




Υλικό και Μέθοδοι

- Αναδρομική μελέτη της πιλοτικής χρήσης του vessilen 04/2023–06/2024
- Όλοι οι ασθενείς πριν την έγχυση είχαν υποβληθεί:

1. Καλλιέργεια ούρων
2. Κυστεοσκόπηση
3. Στοχευμένη αντιβιοτική αγωγή
4. Υπέρηχο ΝΟΚ
5. Τοπική αναισθησία
6. Στόχος →8 εβδομαδιαίες εγχύσεις χωρίς υποτροπή
7. Υποτροπή = θετική καλλιέργεια ούρων & συμπτωματολογία ουρολοίμωξης.

Αποτελέσματα από την πιλοτική προοπτική χρήση του Vessilen



Συμπέρασμα

- ελάχιστα επεμβατική θεραπεία
- ασφαλής και αποτελεσματική σε σημαντικό ποσοστό ασθενών με υποτροπιάζουσες κυστίτιδες οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται σε άλλη φαρμακευτική αγωγή.
- απαιτείται διασταύρωση των αποτελεσμάτων σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και σε πιο μακροπρόθεσμη βάση

Σύγκρουση συμφερόντων: η εταιρεία Allertec, λόγω ευγενικής χορηγίας του Urolon που χρησιμοποιήθηκε στις πρώτες 3 ασθενείς,, καθώς και για ταξιδιωτικές/εκπαιδευτικές χορηγίες.

Αποτελέσματα

✓15 ασθενείς (10 γυναίκες)

✓7 ασθενείς (46,67 %) ολοκλήρωσαν τη θεραπεία των 8 εβδομαδιαίων εγχύσεων έχοντας πλήρη ίαση

✓3/15 ολοκλήρωσαν την θεραπεία με επιπλοκές (20%):

- υποτροπή μετά την 3η έγχυση αλλά ολοκλήρωσε τη θεραπεία παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση στην κλινική εικόνα & αρνητική καλλιέργεια (γυναίκα)

- μία ασθενής παρουσίασε έντονη συμπτωματολογία και θετική καλλιέργεια ούρων μετά την 8η έγχυση (γυναίκα)

- ένας άνδρας ασθενής παρουσίασε υποτροπή μετά την 8η έγχυση – υποβλήθηκε σε ριζική κυστεκτομή διάσωσης

✓5 ασθενείς (4 άνδρες & 1 γυναίκα), δεν ολοκλήρωσαν την θεραπεία:

- ένας άνδρας και μία γυναίκα (13,33)% βρίσκονται στην 6η και 4η δόση, αντίστοιχα, με σταθερή βελτίωση, χωρίς υποτροπή

- 3 άνδρες διέκοψαν λόγω αποτυχίας απάντησης (20%)

- Ενδοκυστική έγχυση BOTOX 200IU μετά την 3η δόση
- Δύο άνδρες διέκοψαν την θεραπεία μετά την 3η και 4η δόση.

✓N=2 γυναίκες: έναρξη αναμνηστικών μηνιαίων εγχύσεων με σταθερή κλινική βελτίωση.