Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

Τζελβές Λ [1,2], Day Elizabeth [1], Bhudia Amit [1], Markov Mark [1], Al-Bermani Osama [1], Olphert Joanna [1], Μανωλίτσης Ι. [2], Λαρδάς Μ. [2], Λαζάρου Λ. [2], Sridhar Ashwin [1], Kelly John [1], Ta Anthony [1]

: [1] Department of Urology, University College London Hospitals, London, United Kingdom [2] Β΄ Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Σισμανόγλειο ΓΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ

Η σεξουαλική δυσλειτουργία αποτελεί συνέπεια της ριζικής κυστεκτομής (RC). Η κατανόηση της έκτασης και του αντίκτυπου αυτής στις γυναίκες παρουσιάζει προκατάληψη ως προς το φύλο. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην περιγραφή της γυναικείας σεξουαλικής λειτουργίας και των κολπικών συμπτωμάτων μετά από ριζική κυστεκτομή.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Εντοπίστηκαν όλες οι γυναίκες ασθενείς που υποβλήθηκαν σε RC μεταξύ Ιανουαρίου 2017 και Δεκεμβρίου 2022 σε ένα μόνο ίδρυμα. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών, της νόσου και της χειρουργικής επέμβασης ανακτήθηκαν από τους ηλεκτρονικούς φακέλους υγειονομικής περίθαλψης. Η διατήρηση των οργάνων ορίστηκε ως διατήρηση της μήτρας +/- των ωοθηκών. Τα ερωτηματολόγια Female Sexual Function Index- 6 (FSFI-6) και Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory 6 (POPDI-6) χορηγήθηκαν αυτοβούλως. Η τιμή 19 για το FSFI-6 χρησιμοποιήθηκε ως φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία.

Patient Characteristics			Sexual function		
	n	%		n	%
Number Patients	31		FSFI-6	31 respondents	
Median Age			Sexually active before surgery	10	0.32
Age range			Sexually active after surgery	6	0.19
Neobladder	4		Sexual desire	13	0.42
Ileal Conduit	27		Of those that are sexually active		
Robotic			Normal function*	0	0.00
Open			Pain on sexual activity	3	0.10
Disease Characteristics			Vaginal health		
T stage			Vaginal discharge	6	0.19
T0	5	0.16	Sought treatment for vaginal symptoms	5	0.16
Tis/Ta/T1	8	0.26	POPDI-6	29 respondents	
T2	12	0.39	Bulge in vagina (score 1 or more)	18	0.62
T3/T4	6	0.19	Need for digital pressure to evacuate bowels (score 1 or more)	17	0.59

*βαθμολογία πάνω από 20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

86 ασθενείς ήταν προσβάσιμοι, εκ των οποίων οι 31 (36%) απάντησαν στα ερωτηματολόγια (πίνακας). Συνολικά, 6 γυναίκες (19%) ήταν σεξουαλικά ενεργές. 13 γυναίκες (42%) ανέφεραν σεξουαλική επιθυμία, και 5 γυναίκες (15%) έχουν ζητήσει θεραπεία για κολπικά συμπτώματα. Κολπικές εκκρίσεις και κολπική διόγκωση αναφέρθηκαν από 6 (19%) και 15 (62%) αντίστοιχα. Η στατιστική σύγκριση μεταξύ των χειρουργικών προσεγγίσεων δεν ήταν δυνατή λόγω του μικρού αριθμού των ομάδων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η σεξουαλική λειτουργία φαίνεται να αποτελεί σημαντικό στοιχείο της επιβίωσης μετά από RC. Πάνω από το 40% των γυναικών αναφέρουν σεξουαλική επιθυμία χωρίς καμία να έχει φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία. Αν και τα δεδομένα περιορίζονται από την απουσία προεγχειρητικών πληροφοριών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή της ενημέρωσης των ασθενών, την καθοδήγηση των μετεγχειρητικών διαβουλεύσεων και την ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης.

RESEARCH POSTER PRESENTATION DESIGN © 2015
www.PosterPresentations.com