
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (FURS) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ (PCNL) ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ 2 – 3.5cm

Φιλντίσης Ανδρέας, Χιώτης Πέτρος, Γεωργάκης Ευάγγελος, Μανιάκος Νικόλαος, Ελευθερόπουλος Ιωάννης, Δελακάς Δημήτριος
Ουρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα


ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ


- Αναδρομική μελέτη, Σεπτέμβριος 2020 -Σεπτέμβριος 2023
- 162 ασθενείς: 90 άνδρες/72 γυναίκες, μ.ο. 55 έτη
- Μονήρεις νεφρικοί λίθοι 2.0 - 3.5 εκ.
- 82 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με f-URS
- 80 με PCNL σε πρηνή θέση υπό γενική αναισθησία
- Η επιλογή της μεθόδου έγινε με βάση το ιστορικό, τη νεφρική λειτουργία, την ύπαρξη λειτουργικού ετερόπλευρου νεφρού, τη θέση του λίθου και τις συννοσηρότητες κάθε ασθενή
- 140 ασθενείς είχαν ιστορικό προηγούμενης θεραπείας για λιθίαση



ΣΚΟΠΟΣ

Σύγκριση της εύκαμπτης ουρητηροσκόπησης (f-URS) (με ουρητηροσκόπιο μίας χρήσης) και της διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας (PCNL) ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια τους





ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Ο καθαρός χειρουργικός χρόνος ήταν παρόμοιος
- Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε PCNL παρέμειναν το διπλάσιο χρόνο στο χώρο του χειρουργείου και ο χρόνος νοσηλείας τους ήταν τετραπλάσιος
- Ο αριθμός και η βαρύτητα των περιεγχειρητικών λοιμώξεων δε συσχετίστηκε με τη μέθοδο
- Τα ποσοστά απόλυτα επιτυχούς λιθοτριψίας ήταν μεγαλύτερα στην ομάδα της PCNL, μετά από ένα μήνα
- Στον επανέλεγχο (3 και 6 μήνες) τα ποσοστά δεν είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά
- Δεν απαιτήθηκε σε καμία από τις δύο μεθόδους μετάγγιση ασθενούς και τροποποίηση ή διακοπή της χειρουργικής επέμβασης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Η f-URS έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια με την PCNL σε νεφρικούς λίθους 2.0 – 3.5 cm, ανεξάρτητα από τη θέση του λίθου
- Η f-URS είναι λιγότερο επεμβατική μέθοδος και η επαναφορά των ασθενών στις δραστηριότητες είναι άμεση
- Προσωπικοί παράγοντες συμβάλλουν στην επιλογή της μεθόδου και δεν πρέπει να παραβλέπονται

