

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΥΣΤΕΟΚΗΛΗΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΝΗΤΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΜΑΣ. Ουρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

ΣΚΟΠΟΣ: Η πρόπτωση των πυελικών οργάνων αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας, επηρεάζοντας το 6-8% των γυναικών, με το πρόσθιο κολπικό τοίχωμα να είναι το πιο συχνά εμπλεκόμενο ανατομικό σημείο δημιουργίας κήλης. Έχουν περιγραφεί διάφορες χειρουργικές τεχνικές, με ή χωρίς τη χρήση κολπικών πλεγμάτων για την αποκατάσταση της κυστεοκήλης, τα οποία συχνά συνδέονται με μετεγχειρητικές επιπλοκές και επανεπεμβάσεις. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της τοποθέτησης συνθετικών πλεγμάτων σε 7 περιπτώσεις γυναικών με κυστεοκήλη και η καταγραφή των άμεσων και απώτερων επιπλοκών.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στο διάστημα από 01/01/2022 έως 01/06/2024 τοποθετήθηκαν στην κλινική μας επτά συνθετικά κολπικά πλέγματα (*Calistar S©*; *Promedon*, Argentina) σε ασθενείς με κυστεοκήλη. Ανασκοπήθηκαν τα ιατρικά αρχεία των επτά γυναικών που υποβλήθηκαν στη χειρουργική αποκατάσταση κυστεοκήλης με τη χρήση συνθετικού πλέγματος και καταγράφηκαν τα δημογραφικά στοιχεία, οι κλινικές ενδείξεις, η χειρουργική τεχνική που ακολουθήθηκε, καθώς και τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα και επιπλοκές. Η παρακολούθηση των ασθενών πραγματοποιήθηκε για μέσο χρονικό διάστημα 18 μηνών μετά την επέμβαση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τις 7 ασθενείς, όλες ανέφεραν βελτίωση των συμπτωμάτων της κυστεοκήλης κατά την πρώτη μετεγχειρητική αξιολόγηση στις 6 εβδομάδες. Άμεσα μετεγχειρητικά δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές επιπλοκές όπως ανάγκη για μετάγγιση αίματος, διάτρηση του πλέγματος (όπως ανέφερε η ειδοποίηση του FDA το 2019), ή λοιμώξεις μαλακών μορίων. Ωστόσο, σε δύο περιπτώσεις παρατηρήθηκε ελαφρά ενόχληση στην περιοχή του πλέγματος, η οποία αντιμετωπίστηκε με συντηρητικά μέσα. Μία ασθενής στο ετήσιο follow-up ανέφερε αμετάβλητο το αίσθημα της δυσπαρεύνιας, το οποίο όμως δεν ήταν η κύρια ένδειξη της επέμβασης. Καμία ασθενής δεν παρουσίασε υποτροπή της κυστεοκήλης κατά την περίοδο παρακολούθησης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρήση συνθετικού πλέγματος για την αποκατάσταση της κυστεοκήλης φαίνεται να είναι μια αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος παρά την επιφυλακτική στάση που συντηρεί ο FDA, με χαμηλό ποσοστό επιπλοκών και ικανοποιητικά αποτελέσματα. Κατά τη δική μας εμπειρία, η συγκεκριμένη χειρουργική τεχνική δεν παρουσίασε σοβαρές άμεσες ή απώτερες επιπλοκές και κυρίως καμία περίπτωση διάβρωσης του συνθετικού πλέγματος ή λοίμωξης μαλακών μορίων.