Τα χαρακτηριστικά των ασθενών που υποβάλλονται σε μερική νεφρεκτομή

Δ.Α. Σπανομίχου, Κ. Κοτρώτσιος, Π. Κατσικάτσος, Ν. Μουλαβασίλης, Δ. Μητρόπουλος

Α' Ουρολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α Λαϊκό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Σε μικρούς νεφρικούς όγκους (έως 7 εκ.) η μερική νεφρεκτομή αποτελεί θεραπεία εκλογής σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας.
- Τα επιμέρους χαρακτηριστικά του όγκου καθώς και η συνοσηρόττηα του ασθενούς λαμβάνονται υπόψη προεγχειρητικά για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων και την ενημέρωση του ασθενούς.

ΣΚΟΠΟΣ

Η συσχέτιση της συνοσηρότητας με υποομάδες πολυπλοκότητας των διαφόρων νεφρομετρικών βαθμονομήσεων.

ΥΛΙΚΟ/ΜΕΘΟΔΟΣ

- Προοπτική μελέτη
- Διάστημα: 14 μήνες
- Πληθυσμός αναφοράς: 50 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε μερική νεφρεκτομή
- Χαρακτηριστικά ασθενών:
  - Ηλικία
  - Δείκτης μάζας σώματος
  - Σακχαρώδης Διαβήτης
  - Κάπνισμα
- Δείκτες συνοσηροτήτων:
  - Karnofsky
  - AA-CCI
  - CIRS-G
  - ASA
  - ECOG
- Νεφρομετρική βαθμονόμηση:
  - RENAL
  - PADUA
  - SPARE
  - NePhRO

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- 31 άντρες και 19 γυναίκες
- Μέση ηλικία: 63.1 έτη
- Χρησιμοποιώντας πολυωνυμική λογιστική παλινδρόμηση:

❑ Στατιστικά σημαντική συσχέτιση του αποτελέσματος του ECOG με υποομάδες πολυπλοκότητας του SPARE (p=0.016)

❑ Μη δυνατή η πρόβλεψη της ακριβούς υποομάδας πολυπλοκότητας του SPARE.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

- Οι δείκτες συνοσηρότητας είναι ένα δυνητικά καλό προγνωστικό εργαλείο για την εμφάνιση διεγχειρητικών επιπλοκών σε χειρουργεία μερικής νεφρεκτομής.
- Ανάγκη για μεγαλύτερο δείγμα ασθενών ώστε να αναδειχθεί καλύτερα η συσχέτιση των δεικτών νοσηρότητας με τις υποομάδες πολυπλοκότητας των νεφρομετρικών βαθμονομήσεων.