Η χρήση του μοσχεύματος Epiflex στην αντιμετώπιση της νόσου Peyronie



Δουρούμης Κωνσταντίνος[1], Σπανομίχου Δέσποινα[1], Λεβής Παναγιώτης[1], Κουσουρνάς Γεώργιος[2],
Φραγκιάδης Ευάγγελος[1], Αδαμάκης Ιωάννης[1], Μητρόπουλος Διονύσιος[1]
1. Α' Ουρολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α Λαϊκό
2. Χειρουργός Ουρολόγος

Εισαγωγή

- Η νόσος Peyronie αποτελείται από δύο διακριτές φάσεις
- Η αντιμετώπιση εξαρτάται από το στάδιο της νόσου
- Στη σταθερή φάση, σε περιπτώσεις κάμψης άνω των 60° ή μεγάλης παραμόρφωσης, μονόδρομο αποτελούν οι τεχνικές grafting
- **Epiflex®:** ακυτταρικό πτωματικό μόσχευμα ανθρώπινης δερμίδας, με άριστες εμβιομηχανικές προδιαγραφές
- Έχει εφαρμογή ως μόσχευμα στην επανορθωτική ουρολογία
- Παρουσιάζουμε τη χρήση του Epiflex® για την αντιμετώπιση ασθενών με νόσο Peyronie

Μέθοδος


Από το 2009 έως το 2024 αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας **63 ασθενείς** με νόσο Peyronie που χρησιμοποιήθηκε Epiflex®. Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε αποκατάσταση με διατομή της πλάκας και grafting με χρήση Epiflex®.

Χαρακτηριστικά ασθενών:


- Μέση ηλικία: 57.5 έτη
- **Όλοι** οι ασθενείς είχαν:
  - ✓ προεγχειρητικά φυσιολογική στυτική λειτουργία (IIEF>20)
  - ✓ έναρξη νόσου > 12 μήνες
  - ✓ σταθερή κάμψη χωρίς επώδυνη στύση > 6 μήνες
  - ✓ κάμψη > 60°

Η παρακολούθηση ήταν μεταξύ 6-36 μηνών.


Αποτελέσματα



Μετεγχειρητικά αποτελέσματα







Επιπλοκές:

- 1/63 εμφάνισε 6 μήνες μετεγχειρητικά κάμψη που δεν επέτρεπε τη διείσδυση (>30°), αποκαταστάθηκε κατά Nesbit.
- 5/63 εμφάνισαν αιμάτωμα*
- 6/63 ανέφεραν υπαισθησία*
- **Κανένας** δεν εμφάνισε στυτική δυσλειτουργία.

*αυτόματη υποχώρηση

Συμπεράσματα

- Παρουσιάζουμε τη μεγαλύτερη σειρά ασθενών με χρήση ακυτταρικού πτωματικού μοσχεύματος ανθρώπινης δερμίδας
- Τα ποσοστά επιτυχίας είναι παρόμοια με των συχνά χρησιμοποιούμενων μοσχευμάτων
- Η χρήση του Epiflex® σε επεμβάσεις που χρήζουν grafting για αντιμετώπιση της νόσου Peyronie αποτελεί μία ασφαλή και αποτελεσματική λύση.