Η χρήση του ισχνού προσαγωγού για την αποκατάσταση των ουρηθροορθικών συριγγίων


Δουρούμης Κωνσταντίνος, Κατσικάτσος Παναγιώτης, Κοτρώτσιος Κωνσταντίνος, Καλφούντζος Χρήστος, Φραγκιάδης Ευάγγελος, Αδαμάκης Ιωάννης , Μητρόπουλος Διονύσιος
Α' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. Λαϊκόν


Εισαγωγή

- **Αίτια**: χειρουργική επέμβαση ή άλλες θεραπείες για καρκίνο προστάτη και ΚΥΠ
- **Συμπτώματα:** πνευματουρία, παρουσία κοπράνων στα ούρα, αποβολή ούρων από ορθό, πυρετός
- Σπάνια η αυτόματη σύγκλειση, ακόμη και αν έχει προηγηθεί εκτροπή ούρων και κοπράνων
- Η χρήση του ισχνού προσαγωγού ως αιματούμενου κρημνού μεταξύ της ουρήθρας και του ορθού αποτελεί μία από τις πιο ευρέως διαδεδομένες τεχνικές
- Σας παρουσιάζουμε 5 περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν με αυτή την τεχνική στην κλινική μας

Υλικό και μέθοδος

- Μεταξύ 11/2020 και 01/2023 παραπέμφθηκαν στην κλινική μας 5 ασθενείς με ουρηθροορθικό συρίγγιο
- Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με ουρηθρογραφία και ουρηθροκυστεοσκόπηση
- Σε όλες τις περιπτώσεις το αίτιο εμφάνισης του συριγγίου αποτελούσε η ανοιχτή ριζική προστατεκτομή
- Κανένας ασθενής δεν ελάμβανε κάποια θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη την περίοδο που διενεργήθηκε η αποκατάσταση του συριγγίου, ούτε είχε σημεία υποτροπής του καρκίνου
- 2 ασθενείς είχαν υποβληθεί σε early salvage ακτινοθεραπεία μετεγχειρητικά.
- Σε έναν ασθενή είχε προηγηθεί αποτυχημένη προσπάθεια αποκατάστασης με την τεχνική ''York-Mason''
- Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε διαχωρισμό της ουρήθρας από το ορθό με διαπερινεϊκή προσπέλαση, εκτομή του σηραγγώδους πόρου και τοποθέτηση του ισχνού προσαγωγού μυός ως αιματούμενου κρημνού μεταξύ ουρήθρας και ορθού






Αποτελέσματα

- Όλοι ασθενείς είχαν ομαλή μετεγχειρητική πορεία.
- Ο καθετήρας στους ασθενείς αφαιρέθηκε μεταξύ 20ης και 23ης μετεγχειρητικής ημέρας, αφού είχε προηγηθεί ουρηθρογραφία.
- Η μέση περίοδος παρακολούθησης των ασθενών είναι τα 2 έτη.
- Όλοι οι ασθενείς είναι ελεύθεροι υποτροπής.

Συμπεράσματα

- Η αποκατάσταση των ουρηθροορθικών συριγγίων με χρήση του ισχνού προσαγωγού μυός καλή επιλογή
- Η αποκατάσταση με χρήση ισχνού προσαγωγού βιώσιμη λύση , ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις (προηγηθείσα ακτινοθεραπεία, προηγηθέν χειρουργείο για την αποκατάσταση του συριγγίου)



Βιβλιογραφία

Nyam DC, Pemberton JH. Management of iatrogenic rectourethral fistula. Dis Colon Rectum. 1999 Aug;42(8):994-7; discussion 997-9. doi: 10.1007/BF02236689. PMID: 10458120