Καλοήθεις Ινοεπιθηλιακοί Πολύποδες: Ένα Σπάνιο αίτιο στένωσης πυελουρητηρικής συμβολής

Η πενταετής εμπειρία της Κλινικής μας

Μυρτώ Βικτωρία Γκούνη Παπαϊωάννου, Ειρήνη Ιωάννα Ευαγγελάτου, Σταματία Κατελανή, Άννα Παπακωνσταντίνου, Αντώνιος Στεφανίδης, Παναγιώτης Μήτσος


Ουρολογική Κλινική Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία»

Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"

ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Οι ινοεπιθηλιακοί πολύποδες (Fibroepithelial Polyps, FEPs) αποτελούν σπάνιους καλοήθεις όγκους μεσεγχυματικής προέλευσης του ουροποιητικού συστήματος. Εντοπίζονται στην αποχετευτική μοίρα και κυρίως στον ουρητήρα (85% των περιπτώσεων). Συνιστούν ένα εξαιρετικά σπάνιο αίτιο απόφραξης της πυελουρητηρικής συμβολής, ευθυνόμενοι για περίπου 0,5% των περιπτώσεων που αντιμετωπίζονται με πυελοπλαστική

Σκοπός η παρουσίαση 2 περιστατικών που είχαν FEP ως αίτιο της ΣΠΟΣ και η ανάδειξη της σημασίας της διεγχειρητικής αναγνώρισης και πλήρους εκτομής τους



ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ

Περίοδος μελέτης
Ιούλιος 2021 – Ιούνιος 2026

130 πυελοπλαστικές


2 περιστατικά με FEP (1,5%)

Περιστατικό 1 | 15 ετών


- Χωρίς προγεννητική υδρονέφρωση
- Ιστορικό κολικών αριστερού νεφρού από διετίας
- 2 επεισόδια μακροσκοπικής αιματουρίας
- Απεικονιστικός έλεγχος:
  Μεγάλη διάταση ΠΚΣ αριστερά
  Αποφρακτική καμπύλη στο MAG-3 σπινθηρογράφημα

Περιστατικό 2 | 10 ετών

- Ελεύθερο ατομικό ιστορικό
- 1 επεισόδιο κολικοειδούς άλγους ΑΡ νεφρού
- Διαλείπουσα ανώδυνη μακροσκοπική αιματουρία
- Απεικονιστικός έλεγχος:
  Υπερηχογράφημα: διάταση ΠΚΣ αριστερά και σύστοιχου εγγύς ουρητήρα
  Μαγνητική ουρογραφία: περαιτέρω διάταση ΑΡ νεφρού
  MAG-3: αποφρακτική καμπύλη ΑΡ νεφρού




1. Διάταση αριστερού ΠΚΣ



2. MAG-3 με αποφρακτική καμπύλη αριστερού νεφρού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Οι ασθενείς αυτοί υποβλήθηκαν σε πυελοπλαστική, κατά την οποία διαπιστώθηκε παρουσία πολλαπλών πολυποειδών εκβλαστήσεων μεγέθους 2–3 εκ.
- Ακολούθησε εκτομή αυτών μέχρι την αποκάλυψη φυσιολογικού ουροθηλίου και ακόλουθη πυελοπλαστική κατά Hynes-Anderson με διεγχειρητική τοποθέτηση pigtail
- Και οι δύο ασθενείς είχαν ομαλή μετεγχειρητική πορεία



3. Διεγχειρητική εικόνα ινοεπιθηλιακού πολύποδα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Η στένωση της πυελουρητηρικής συμβολής αποτελεί τη συχνότερη αιτία υδρονέφρωσης στην παιδική ηλικία
- Οι ινοεπιθηλιακοί πολύποδες είναι καλοήθεις μεσεγχυματικοί όγκοι με ευνοϊκή βιολογική συμπεριφορά και σπάνια προκαλούν στένωση της πυελουρητηρικής συμβολής
- Επειδή τα απεικονιστικά ευρήματα δεν είναι ειδικά, η διάγνωση τίθεται σχεδόν πάντα κατά τη χειρουργική επέμβαση
- Η αναγνώριση και ο εντοπισμός τους συνιστούν πρόκληση για τον παιδοουρολόγο. Η αντιμετώπιση απαιτεί πλήρη χειρουργική εκτομή