Ejaculatory-sparing Median Lobe-Only MoLEP (MLO MoLEP) σε ενήλικα 41 ετών με συμπτώματα κατωτέρου ουροποιητικού

Ευάγγελος Συμεωνίδης[1], Αστέριος Συμεωνίδης[2], Άρης Καλτσάς[3], Λάζαρος Τζελβές[4], Αντώνιος Μιχαηλίδης[5], Δανάη Χουρμούζη[6], Αθανάσιος Μπέκος[1], Ανδρέας Ανδρέου[1]

[1] Β΄Ουρολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
[2] Α΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ, Γ.Ν.Θ ΄΄Γ. Γεννηματάς», Θεσσαλονίκη
[3] Γ΄Ουρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν «Αττικόν» , Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
[4] Β΄Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
[5] Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Lausanne University Hospital, Lausanne
[6] Ακτινολογικό Τμήμα, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη σε νεότερους ασθενείς θέτει ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς η διατήρηση της εκσπερμάτισης αποτελεί προτεραιότητα για την ποιότητα ζωής. Οι ejaculatory-sparing τεχνικές εκπυρήνισης με laser, με επιλεκτική διατήρηση ιστού γύρω από το verumontanum και τον αυχένα της κύστης, στοχεύουν στην βελτίωση των συμπτωμάτων ούρησης χωρίς διαταραχή της εκσπερμάτισης. Σκοπός είναι η περιγραφή περιστατικού ejaculatory-sparing εκπυρήνισης μέσου λοβού με χρήση MOSES laser σε νέο ασθενή με ευμεγέθη μέσο λοβό.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ


Παρουσιάζεται περίπτωση 41χρονου ασθενή με μετρίου βαθμού αποφρακτικά συμπτώματα κατωτέρου ουροποιητικού συστήματος και συνοδά έντονα ερεθιστικά συμπτώμα από διετίας, με όγκο προστάτη 30ml και ευμεγέθη, προεξέχοντα στην κύστη μέσο λοβό. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε διουρηθρική εκπυρήνιση του μέσου λοβού laser MOSES, με εφαρμογή ejaculatory-sparing τεχνικής, επιλεκτική διατήρηση ιστού περιφερικά του verumontanum και του μεγαλύτερου μέρους των ινών του κυστικού αυχένα, με στόχο τη διατήρηση της εκσπερμάτισης. Εξήλθε την 1η μετεγχειρητική ημέρα, χωρίς μετεγχειρητικές επιπλοκές και άμεση βελτίωση της ροής των ούρων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετεγχειρητικά καταγράφηκε σημαντική βελτίωση της ούρησης, με σταδιακή ανακούφιση από τα προεγχειρητικά ερεθιστικά συμπτώματα. Ο ασθενής ανέφερε επιπλέον υποκειμενικά αισθητή βελτίωση της εκσπερμάτισης, χωρίς παλίνδρομη εκσπερμάτιση, με πλήρη διατήρηση της στυτικής λειτουργίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ejaculatory-sparing εκπυρήνιση μέσου λοβού με laser MOSES φαίνεται ασφαλής και αποτελεσματική επιλογή σε νέους ασθενείς με ΚΥΠ και συμπτωματικό μέσο λοβό, συνδυάζοντας ικανοποιητικό λειτουργικό αποτέλεσμα με διατήρηση, ή και υποκειμενική βελτίωση, της εκσπερμάτισης. Απαιτούνται μελέτες μεγαλύτερης κλίμακας για επιβεβαίωση.





27ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο
22 - 25 Οκτωβρίου 2026
Θεσσαλονίκη
Makedonia Palace Hotel