ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΌ ΔΙΑΥΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 20 ΈΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΡΙΖΙΚΗ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ

Ανδρέας Κουμενής, Ηλίας Γιαννακόδημος, Νικόλαος Ράζος, Τιμολέων Γίαννακας , Ζήσης Κρατήρας, Δημήτριος Δεληγιάννης, Μιχαήλ Χρυσοφός

Γ' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Σκοπός


Το διαυγοκυτταρικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα μπορεί να εμφανίσει εξαιρετικά όψιμη μεταστατική υποτροπή, ακόμη και μετά από αρχικά εντοπισμένη νόσο. Οι ηπατικές μεταστάσεις συνήθως συνυπάρχουν με πολυεστιακή νόσο και η απομονωμένη, χειρουργικά εξαιρέσιμη υποτροπή μετά από δύο δεκαετίες αποτελεί ιδιαίτερη κλινική οντότητα. Σκοπός είναι η παρουσίαση μονήρους ηπατικής μετάστασης σχεδόν 20 έτη μετά από ριζική νεφρεκτομή.

Υλικό – Μέθοδος

Άνδρας 57 ετών είχε υποβληθεί το 2005, σε ηλικία 37 ετών, σε αριστερή ριζική νεφρεκτομή για διαυγοκυτταρικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα σταδίου I, pT1bN0M0. Ο όγκος είχε διαστάσεις 4,6×3,5×2,1 cm, βαθμό III κατά Skinner, ελεύθερα χειρουργικά όρια και απουσία διήθησης ή νέκρωσης. Δεν χορηγήθηκε συμπληρωματική θεραπεία και ο ασθενής εντάχθηκε σε πλάνο παρακολούθησης με ετήσια απεικόνιση για οκτώ έτη η οποία εν συνεχεία διακόπηκε ιδία βουλήσει. Μετά από ελεύθερο νόσου διάστημα 19 ετών και 10 μηνών, τυχαίος υπερηχογραφικός έλεγχο ανέδειξε μονήρη ηπατική μάζα. Η αξονική τομογραφία επιβεβαίωσε βλάβη 9 cm στον αριστερό ηπατικό λοβό, χωρίς άλλη μεταστατική νόσο. Ο ασθενής ήταν ασυμπτωματικός, ECOG 0, με AST 18 U/L, ALT 22 U/L, ολική χολερυθρίνη 0,48 mg/dL, LDH 185 U/L και κρεατινίνη 1,14 mg/dL.

Αποτελέσματα

Ο ασθενής υπεβλήθη σε αριστερή ηπατεκτομή με την ιστολογική εξέταση να αναδεικνύει μετάσταση διαυγοκυτταρικού νεφροκυτταρικού καρκινώματος, με CD10 και RCC marker θετικά και εστιακή θετικότητα PAX8, εκτόμή R0. Στη βιβλιογραφία εντόπιζονται περιστατικά μεταστατικού ccRCC άνω των 15ετών μετά την νεφρεκτομή που αφορούν όμως πολλαπλές μεταστάσεις σε σπλαχνικά όργανα, (Wang 2024, Bruckschen 2021, Ito 2026, Barros 2025, Cao 2022, Ponce 2026).



Εικ 1. Αξονική τομογραφία που αναδεικνύει μονήρη μάζα διαμέτρου 9 cm στον αριστερό λοβό του ήπατος.

Συμπεράσματα

Η μονήρης ηπατική μετάσταση από ccRCC σχεδόν 20 έτη μετά τη νεφρεκτομή είναι σπάνια. Το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη μακροχρόνιας ογκολογικής επαγρύπνησης και τη σημασία της μεταστασεκτομής σε επιλεγμένους ασθενείς χωρίς εξωηπατική νόσο.

Βιβλιογραφία:

1. Bruckschen F, Gerharz CD, Sagir A. Renal cell carcinoma with unusual metachronous metastasis up to 22 years after nephrectomy: two case reports. J Med Case Rep. 2021;15(1):490. Published 2021 Oct 5. doi:10.1186/s13256-021-03098-5
2. Cao H, Sun Z, Wu J, Hao C, Wang W. Metastatic Clear Cell Renal Cell Carcinoma to Pancreas and Distant Organs 24 Years After Radical Nephrectomy: A Case Report and Literature Review. Front Surg. 2022;9:894272. Published 2022 Jul 5. doi:10.3389/fsurg.2022.894272
3. Ponce A, Comfort V, Peeples S. Clear Cell Renal Cell Carcinoma Recurrence Three Decades After Nephrectomy Presenting With New-Onset Diabetes. Cureus. 2026;18(2):e104020. Published 2026 Feb 21. doi:10.7759/cureus.104020
4. Barros S, Relvas LM, Carvalho IM, Ventosa AR, Vaz AM. Clear cell renal cancer metastasis - A case of delayed diagnosis. Rev Esp Enferm Dig. 2025;117(11):669-670. doi:10.17235/reed.2024.10664/2024
5. Wang X, Qian L, Qian Z, et al. Therapeutic options for different metastatic sites arising from renal cell carcinoma: A review. Medicine (Baltimore). 2024;103(21):e38268. doi:10.1097/MD.0000000000038268
6. Ito F, Kobayashi K, Hayashi G, Kamijo S, Fujita T. Very Late Recurrence of Clear Cell Renal Cell Carcinoma With Pancreatic and Hepatic Metastases Showing Durable Response to Dual Checkpoint Blockade. Clin Case Rep. 2026;14(1):e71852. Published 2026 Jan 14. doi:10.1002/ccr3.71852