ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΡΗΞΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΠΥΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΥΡΙΝΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΛΙΘΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΣΤΕΟΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ηλίας Γιαννακόδημος, Νικόλαος Ράζος, Ανδρέας Κουμενής, Τιμολέων Γιάννακας, Ανδρέας Κυριακόπουλος, Άρης Καλτσάς, Δημήτριος Δεληγιάννης, Μάριος Σταυρόπουλος, Ζήσης Κρατήρας, Μιχαήλ Χρυσοφός

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Στο συγκεκριμένο περιστατικό, ο ασθενής παρουσίασε πλήρη αποκατάσταση με φυσιολογική στυτική λειτουργία κατά τη μετεγχειρητική παρακολούθηση, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της πρώιμης χειρουργικής αντιμετώπισης.


ΣΚΟΠΟΣ

Το κάταγμα πέους αποτελεί μια σπάνια ουρολογική επείγουσα κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από ρήξη του ινώδους χιτώνα ή/και των σηραγγωδών σωμάτων του πέους. Η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση χειρουργική αποκατάσταση αποτελούν τη θεραπεία εκλογής, εξασφαλίζοντας άριστα λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Παρουσιάζεται η επείγουσα αντιμετώπιση ενός περιστατικού κατάγματος πέους μετά από σεξουαλική επαφή, χωρίς συνοδό κάκωση ουρήθρας.





ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Άνδρας ηλικίας 26 ετών προσήλθε στα επείγοντα μετά από κάκωση του πέους κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής. Ο ασθενής ανέφερε αιφνίδιο έντονο πόνο, άμεση απώλεια της στύσης και ταχεία εμφάνιση εκτεταμένου αιματώματος του πέους. Η κλινική εξέταση ανέδειξε σημαντικό οίδημα και εκχύμωση, συμβατά με κάταγμα πέους. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος επιβεβαίωσε τη ρήξη του ινώδους χιτώνα των σηραγγωδών σωμάτων, χωρίς ενδείξεις συνοδού κάκωσης της ουρήθρας. Ο ασθενής οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο, όπου πραγματοποιήθηκε διερεύνηση του τραύματος. Στο σημείο της κάκωσης του πέους, έγινε διατομή του δέρματος και δαρτού και παρασκευή των δομών έως την περιτονία του Bucks. Στη συνέχεια αναγνωρίστηκε το έλειμμα του ινώδους χιτώνα και έγινε συρραφή της ρήξης του ινώδους χιτώνα με απορροφήσιμα ράμματα. Έγινε σύγκλειση των περιτονιών και του δέρματος κατά συνέχεια. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή, χωρίς επιπλοκές. Τρεις μήνες μετά την αποκατάσταση της ρήξης του ινώδους χιτώνα, ο ασθενής είχε φυσιολογική στύση, χωρίς κάμψη του πέους ή διαταραχές στην ούρηση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το κάταγμα πέους αποτελεί επείγουσα χειρουργική οντότητα, με τη διάγνωση να βασίζεται κυρίως στο ιστορικό και την κλινική εικόνα. Η άμεση χειρουργική αποκατάσταση υπερτερεί της συντηρητικής αντιμετώπισης, καθώς σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά επιπλοκών, όπως στυτική δυσλειτουργία, κάμψη του πέους και επώδυνη στύση. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, ο ασθενής παρουσίασε πλήρη αποκατάσταση με φυσιολογική στυτική λειτουργία κατά τη μετεγχειρητική παρακολούθηση, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της πρώιμης χειρουργικής αντιμετώπισης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλίας Γιαννακόδημος
Γ' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αττικόν
Email: iliasgiannakodimos@gmail.com
Τηλέφωνο: 6977809693

POSTER TEMPLATE DESIGNED BY GENIGRAPHICS ©2012
1.800.790.4001 WWW.GENIGRAPHICS.COM